

## **REHIDRAL**

### **Sestava**

1 vrečka (22,3 g) vsebuje:  
16,20 g glukoze, 1,15 g natrijevega klorida, 1,50 g kalijevega klorida, 2,60 g natrijevega citrata in 0,85 g natrijevega hidrogenkarbonata.

### **Lastnosti**

Napitek iz Rehidral praška priporočamo za nadomeščanje mineralov in tekočine pri diareji in po večjih telesnih aktivnostih.

### **Odmerjanje in uporaba**

Vsebino vrečke raztopite v 1 L prekuhane vode. Po športnih aktivnostih priporočamo vsebino 1 vrečke dnevno. Pri diareji priporočamo prve 4 ure čim pogostejše uživanje raztopine v odmerku 50 – 100 ml na kg telesne mase. V naslednjih dneh po vsaki mehkejši ali tekoči stolici še 10 ml raztopine na kg telesne mase.

### **Opozorilo**

Po jemanju zdravila lahko bolnik bruha, kar je lahko posledica prehitrega pitja raztopine. V takem primeru počakajte 5 – 10 minut in mu nato dajajte raztopino v majhnih požirkih. Če se bruhanje kljub temu ne ustavi, takoj prekinite zdravljenje in se posvetujte z zdravnikom! Previdna uporaba raztopine je potrebna pri bolnikih s srčnimi obolenji, poslabšanim delovanjem ledvic, intoleranco na glukozo in dieto z nadzorovanim vnosom kalija ali natrija. Zdravilo lahko uporabljajo nosečnice in doječe matere.

### **Shranjevanje**

Shranjujte pri temperaturi do 25°C.

Shranjujte nedosegljivo otrokom!

Zdravilo Rehidral je galenski izdelek, ki se izdaja brez recepta v lekarnah.