

Pred uporabo natančno preberite to navodilo, ker vsebuje pomembne podatke za vas! Slezov sirup je na voljo v lekarnah brez recepta, kljub temu ga morate uporabljati pazljivo in skrbno, da vam bo kar najbolj koristil. Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati. Posvetujte se s farmacevtom, če potrebujete dodatne informacije ali nasvet. Če katerikoli neželeni učinek postane resen ali če opazite katerikoli neželeni učinek, ki ni omenjen v tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.

SLEZOV SIRUP

Navodilo za uporabo vsebuje:

1. Kaj je Slezov sirup in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili Slezov sirup
3. Kako jemati Slezov sirup
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje in rok uporabnosti
6. Dodatne informacije

1. Kaj je Slezov sirup in za kaj ga uporabljamo

kako Slezov sirup deluje

Slezov sirup vsebuje sluzi iz slezovih korenin, ki v tankem sloju prevlečejo sluznico ust in žrela, jo zaščitijo pred draženjem in tako pomirjajo suh in dražeč kašelj.

Kdaj uporabljati Slezov sirup

Slezov sirup priporočamo pri obolenjih dihalnih poti, ki jih spremlja suh in dražeč kašelj, ter pri hripavosti. Primeren je za otroke in odrasle.

2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili Slezov sirup

Slezov sirup ne uporabljajte

- če ste preobčutljivi na katero od sestavin,
- pri mokrem, produktivnem kašlju (v tem primeru uporabite Sirup za izkašljevanje).

Bodite posebno pozorni

- če se pojavi težko dihanje, visoka vročina ali gnojni izpljunek, morate takoj poiskati pomoč pri svojem zdravniku,
 - če ste sladkorni bolnik,
- uporabo sirupa odsvetujemo pri ljudeh s prirojeno netoleranco fruktoze, pri glukoza-galaktoza malabsorpcijskem sindromu in pomanjkanju saharozne-izomaltaze.

Previdnostni ukrepi in opozorila

Če se v 5 do 7 dneh stanje ne izboljša ali se celo poslabša, morate obiskati zdravnika.

Jemanje drugih zdravil

Absorpcija zdravila vzetega sočasno s Slezovim sirupom je lahko upočasnjena, zato priporočamo jemanje drugih zdravil s ½ do 1 urnim presledkom. Obvestite svojega zdravnika ali farmacevta, če jemljete katerokoli zdravilo, tudi če ste ga dobili brez recepta.

Jemanje Slezovega sirupa skupaj s hrano in pijačo

Zdravilo lahko jemljete ne glede na obroke hrane.

Nosečnost in dojenje

Ni podatkov. Če ste noseči ali dojite, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom preden uporabite katerokoli zdravilo.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev

Ni znano, da bi Slezov sirup vplival na sposobnost upravljanja vozil ali strojev.

Pomembne informacije o nekaterih sestavinah zdravila

Izdelek vsebuje 128 g saharoze. Z vsakim odmerkom zaužijete od 4,2 g (5 ml) do 12,6 g (15 ml) saharoze, če zdravilo jemljete v skladu z navodilom za odmerjanje.

To morajo upoštevati sladkorni bolniki. Slezov sirup vsebuje konzervansa metilparahidroksibenzoat in propilparahidroksibenzoat, ki lahko povzročita alergijske reakcije (lahko zapoznele).

3. Kako jemati Slezov sirup

Odmerjanje in način uporabe

Natančno upoštevajte navodila farmacevta ali zdravnika. Če zdravnik ali farmacevt ne svetujeta drugače, upoštevajte naslednja navodila za odmerjanje:

STAROST	POSAMEZNI ODMEREK
Otroci mlajši od 1 leta	5 ml
Otroci 1 – 6 let	5 – 10 ml
Otroci 6 – 14 let	15 ml
Odrasli in otroci starejši od 14 let	15 – 30 ml

Takšen odmerek priporočamo 3 do 4-krat na dan. Neposredno po uporabi zdravila ne uživajte hrane in pijače, da le-ta ne bi pospešila odstranjevanja zdravila z ustne sluznice in žrela. Pred uporabo steklenico pretresite. Priporočljivo je, da ob sirupu uživete veliko čaja in toplih napitkov.

Ukrepi pri prevelikem odmerjanju

Ne jemljite večjih odmerkov od priporočenih. Ni podatkov o zastrupitvah pri prevelikem odmerjanju.

4. Možni neželeni učinki

Kot vsa zdravila ima lahko tudi Slezov sirup neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih. Ob jemanju sirupa se lahko pojavijo preobčutljivostne reakcije. Zaradi sladkorja je lahko povečano tveganje za razvoj zobnega kariesa. Če se pojavi katerikoli neželeni učinek, sirup prenehajte jemati in se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

5. Shranjevanje in rok uporabnosti

Shranjujte pri temperaturi do 25 °C.

Shranjujte nedosegljivo otrokom!

Slezov sirup ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na ovojnini. Datum izteka roka uporabnosti se nanaša na zadnji dan navedenega meseca. Galenski izdelek ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke, ampak med nevarne odpadke v komunalnih zbirnih centrih ali kot odpadna zdravila v lekarni.

Takšni ukrepi pomagajo varovati okolje.

6. Dodatne informacije

Sestava

Zdravilna učinkovina je tekoči ekstrakt korenine navadnega sleza. 15 ml (19,66 g) peroralne raztopine vsebuje 6,76 g tekočega ekstrakta korenine navadnega sleza (*Althaea officinalis* L., radix) (1 : 16). Ekstrakcijsko topilo: voda.

Pomožne snovi: metilparahidroksibenzoat (E218), propilparahidroksibenzoat (E216), saharoza in prečiščena voda.

Videz Slezovega sirupa in oprema

Slezov sirup je rumenkaste barve, z značilnim vonjem in okusom po slezu. Na voljo so škatle s 150 ml sirupa v steklenici z odmernim lončkom in priloženim navodilom.

Način izdaje Slezovega sirupa

Slezov sirup je galenski izdelek, ki se izdaja brez recepta v lekarnah.