

Navodilo za uporabo

Pred začetkom uporabe galenskega izdelka natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! Pri uporabi tega galenskega izdelka natančno upoštevajte napotke v tem navodilu ali navodila zdravnika oziroma farmacevta.

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Posvetujte se s farmacevtom, če potrebujete dodatne informacije ali nasvet.
- Če opazite katerikoli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. Glejte poglavje 4.
- Če se znaki vaše bolezni poslabšajo ali ne izboljšajo v 1 tednu, se posvetujte z zdravnikom.

MAZILO PROTI HEMOROIDOM

NAVODILO ZA UPORABO VSEBUJE:

1. Kaj je Mazilo proti hemoroidom in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili Mazilo proti hemoroidom
3. Kako uporabljati Mazilo proti hemoroidom
 4. Možni neželeni učinki
 5. Shranjevanje in rok uporabnosti
 6. Dodatne informacije

1. Kaj je Mazilo proti hemoroidom in za kaj ga uporabljamo KDAJ UPORABLJATI MAZILO PROTI HEMOROIDOM

Mazilo proti hemoroidom priporočamo za zdravljenje notranjih in zunanjih hemoroidov, ekcema in srbečice okoli zadnjika, analnih razpok ter za lajšanje težav pred in po operaciji hemoroidov.

KAKO MAZILO PROTI HEMOROIDOM DELUJE

Mazilo proti hemoroidom vsebuje učinkovine, ki lajšajo težave pri hemoroidih.

Bizmutov subgalat, cinkov oksid, perujski balzam in tekoči ekstrakt virginskega nepozabnika delujejo adstringentno in antiseptično. Izvleček vrtnega ognjiča deluje protivnetno, protimikrobno in pospešuje celjenje ran. Lidokainijev klorid blaži bolečine in srbenje.

2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili Mazilo proti hemoroidom MAZILO PROTI HEMOROIDOM NE UPORABLJAJTE

- če ste alergični na katerikoli sestavino tega izdelka (navedeno v poglavju 6).

OPOZORILA IN PREVIDNOSTNI UKREPI

Če se vam stanje v 1 tednu ne izboljša ali se celo poslabša, se posvetujte z zdravnikom!
V primeru pogostih krvavitev iz hemoroidov se pred uporabo Mazila proti hemoroidom posvetujte z zdravnikom.

Ne sme priti v stik z očmi; če se to zgodi, jih izperite z veliko količino mlačne vode.

DRUGA ZDRAVILA IN MAZILO PROTI HEMOROIDOM

Lidokainijev klorid lahko spremeni delovanje zdravil, ki se uporabljajo pri aritmiji srca, zato priporočamo previdnost pri uporabi mazila pri teh bolnikih.

NOSEČNOST IN DOJENJE

Ni podatkov o varnosti uporabe Mazila proti hemoroidom v času nosečnosti ali dojenja.

POMEMBNE INFORMACIJE O NEKATERIH SESTAVINAH ZDRAVILA

Mazilo proti hemoroidom vsebuje:

- lanolin (E913), ki lahko povzroči lokalne kožne reakcije,
- perujski balzam, ki lahko povzroči lokalne kožne reakcije.

3. Kako uporabljati Mazilo proti hemoroidom

Pri uporabi tega galenskega izdelka natančno upoštevajte napotke v tem navodilu, navodila zdravnika ali farmacevta. Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Mazilo proti hemoroidom je najbolje uporabljati po odvajanju blata. Pred nanosom je potrebno analni predel temeljito očistiti z mlačno vodo, sveže pripravljenim kamiličnim čajem ali čajem iz hrastove skorje. Pri zunanjih hemoroidih nanesite mazilo v tankem sloju na prizadeti predel 2 do 3-krat dnevno, tako da ga nežno vtrete. Pri notranjih hemoroidih s pomočjo priloženega nastavka previdno iztisnite mazilo iz tube v danko. Priporočena je uporaba mazila dvakrat dnevno (zjutraj in zvečer). Zdravljenje z Mazilom proti hemoroidom lahko traja največ 14 dni. Uporaba rektalnega mazila lahko povzroči obarvanost perila, zato svetujemo, da perilo na primeren način zaščitite.

4. Možni neželeni učinki

Kot zdravila ima lahko tudi Mazilo proti hemoroidom neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih. V redkih primerih lahko Mazilo proti hemoroidom povzroči kožne preobčutljivostne reakcije ali draženje kože na mestu nanosa. Če se pojavi katerikoli neželeni učinek, prenehajte uporabljati to zdravilo in se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

POROČANJE O NEŽELENIH UČINKIH

Če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

O neželenih učinkih lahko poročate tudi neposredno na naslov:

Univerzitetni klinični center Ljubljana,
Interna klinika, Center za zastrupitve
Zaloška cesta 2
SI-1000 Ljubljana
Faks št. +386 (0)1 434 76 46
e-pošta: farmakovigilanca@kclj.si

S tem, ko poročate o neželenih učinkih, lahko prispevate k zagotovitvi več informacij o varnosti tega izdelka.

5. Shranjevanje in rok uporabnosti

Mazilo proti hemoroidom shranjujte zaščiteno pred svetlobo pri temperaturi do 25 °C v originalni ovojnini! Shranjujte nedosegljivo otrokom! Mazilo proti hemoroidom ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na obojnini. Datum izteka roka uporabnosti se nanaša na zadnji dan navedenega meseca. Izdelka ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke, ampak med nevarne odpadke v komunalnih zbirnih centrih ali kot odpadna zdravila v lekarni. Taki ukrepi pomagajo varovati okolje.

6. Dodatne informacije

SESTAVA

1 g rektalnega mazila vsebuje:

30 mg lidokainijevega klorida (Lidocaini hydrochloridum), 20 mg ognjičeve tinkture (vodno etanolni izvleček iz *Calendulae officinalis* L., flos.), 50 mg tekočega ekstrakta listov virginskega nepozebnika (*Hamamelis virginiana* L., folium), 50 mg bizmutovega subgalata (*Bismuthi subgallas*), 50 mg cinkovega oksida (*Zinci oxidum*), 50 mg perujskega balzama (*Balsamum peruvianum*), Pomožne snovi: beli vazelin, lanolin (E913).

IZGLED MAZILA PROTI HEMOROIDOM IN VSEBINA PAKIRANJA

Mazilo proti hemoroidom je rumenorjave barve, značilnega vonja.
Na voljo je tuba s 30 g mazila v škatlici z nastavkom in s priloženim navodilom.

NAČIN IZDAJE MAZILA PROTI HEMOROIDOM

Mazilo proti hemoroidom je galenski izdelek, ki se izdaja brez recepta v lekarnah.

PROIZVAJALEC

Obalne lekarne Koper
Galenski laboratorij
OIC – Hrpelje 14 C, Kozina