



OBALNE LEKARNE KOPER
GALENSKI LABORATORIJ
OIC - Hrpelje 14 C, Kozina

REHIDRAL

22,3 g praška
za peroralno raztopino

PRAŠEK ZA REHIDRACIJO

DELOVANJE

Napitek, pripravljen z Rehidral praškom, priporočamo za nadomeščanje elektrolitov in tekočine pri driski in po večjih telesnih aktivnostih.

ODMERJANJE IN UPORABA

Vsebino vrečke raztopite v 1 L prekuhane pitne vode.

- **PO VEČJIH ŠPORTNIH AKTIVNOSTIH**

Priporočamo vsebino 1 vrečke dnevno.

- **PRI DRISKI IN**

- **DRUGIH STANJIH DEHIDRIRANOSTI**

V prvih 4 urah priporočamo čim pogostejše uživanje raztopine v odmerku 50-100 ml na kg telesne mase.

V naslednjih dneh, po vsakem mehkejšem ali tekočem odvajanju blata, spijte še 10 ml raztopine na kg telesne mase.

Serijska št.: 02460623

Uporabno do: **10.2024**

SESTAVA

1 vrečka (22,3 g) vsebuje
16,20 g glukoze, 1,15 g natrijevega klorida,
1,50 g kalijevega klorida, 2,60 g natrijevega citrata
in 0,85 g natrijevega hidrogenkarbonata.

Ne vsebuje pomožnih snovi.

OPOZORILO

Po zaužitju praška lahko bolnik bruha,
kar je lahko posledica prehitrega pitja raztopine.

V takem primeru počakajte 5-10 minut in
mu nato dajajte raztopino v majhnih požirkih.
Če se bruhanje kljub temu ne ustavi, takoj prekinite
zdravljenje in se posvetujte z zdravnikom.

Previdna uporaba raztopine je potrebna
pri bolnikih s srčnimi obolenji, poslabšanim
delovanjem ledvic, intoleranco na glukozo in
dieta z nadzorovanim vnosom kalija ali natrija.

Rehidral lahko uporabljajo
nosečnice in doječe matere.

Posebna previdnost pa je potrebna
v primeru nosečnosti toksemije.

SHRANJEVANJE

Shranjujte pri temperaturi do 25 °C.
Shranjujte nedosegljivo otrokom!

Rehidral je galenski izdelek,
ki se izdaja brez recepta v lekarnah.

